

## 关于食道癌的重粒子线治疗概述

治疗方案编号：1804

|                     |  |
|---------------------|--|
| 治疗方案                | 食道癌的重粒子线治疗 1804  |
| 对象                  | 胸部食道癌（cT1N0M0）   |
| 治疗方法                | 总剂量 48.0-50.4Gy (RBE)/12 次/3 周   |
| 适合治疗的对象<br>(病状和条件)  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通过活组织检查被诊断为食道癌、内窥镜检查可见可评估病变。</li><li>2. 胸部食道癌（cT1N0M0）(UICC 第 7 版)。但是，T1a 建议通过内窥镜切除。</li><li>3. Performance Status (ECOG) 0-2。</li><li>4. 患者本人已被告知病名和病情、本人已签署书面同意书。</li><li>5. 由专家会诊判断为适合重粒子线治疗的。</li></ol>   |
| 不适合治疗的对象<br>(病状和条件) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 既往对该食道癌有治疗经历的。</li><li>2. 治疗部位曾接受过放射线治疗。</li><li>3. 有临床症状的间质性肺炎。</li><li>4. 在照射部位有创伤和活跃性的难治性感染、炎症疾患的。</li><li>5. 在其他器官中有活跃的多发性癌症。但是不包括通过根治性治疗判断为治愈的病例、或预期治愈的病例（建议先进行其他恶性肿瘤的治疗）。</li><li>6. 有可能怀孕或在孕期、哺乳期。</li><li>7. 由于医疗、心理或其他因素判断为不合适时。</li></ol> |